

FICHE DE PRISE EN CHARGE DES BESOINS MÉDICAUX SPÉCIFIQUES
D'UN ENFANT DANS LE TEMPS ET L'ESPACE SCOLAIRE, ENFANT PRÉSENTANT
UN **DIABÈTE DE TYPE 1** AVEC SCHÉMA BASAL PRANDIAL OU MULTI-INJECTIONS

Document à remplir lors de l'inscription ou au moment du diagnostic d'une pathologie et à revoir régulièrement
(à adapter selon les besoins et réalités de terrain)

**A COMPLÉTER EN CONCERTATION AVEC L'ÉLÈVE, SES PARENTS, LA DIRECTION, LES ENSEIGNANTS CONCERNÉS,
LE SERVICE PSE OU LE CENTRE PMS, LE MÉDECIN TRAITANT...**

Nom et prénom de l'enfant : Date de naissance :/...../..... Classe : Photo :	
Nom des parents ou du représentant légal Tél (s) : Adresse(s) :	Nom du pédiatre diabétologue : Tél : Adresse : Tél convention :
QUAND FAIRE UN CONTRÔLE GLYCÉMIQUE ? ENFANT AVEC SCHÉMA BASAL PRANDIAL OU MULTI INJECTIONS	CONTRÔLE GLYCÉMIQUE SOUHAITÉ en fonction de l'enfant (environ toutes les 2h) <ul style="list-style-type: none"> • Avant la collation du matin : • Avant le repas de midi : • Avant le goûter/fruit dans l'après-midi : • • Si symptômes d'hypoglycémie ou d'hyperglycémie. Quelle que soit l'heure ou alarme CGM (continuous glucose monitoring). Faire un contrôle glycémique soit au doigt ou par le scanner ou le CGM. Contrôler également en cas de comportement inhabituel de l'enfant. Noter dans le carnet de glycémie

<p>ADMINISTRATION DES MÉDICAMENTS</p> <p>Lieu où l'insuline est mise à disposition :</p> <p>.....</p> <p>Coordonnées des personnes pouvant y accéder :</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>Pour les injections : stylo (cfr annexe pour l'utilisation). Les stylos en cours d'utilisation se conservent à température ambiante à moins de 25 degrés °C.</p>	<p>INSULINOTHERAPIE PAR INJECTION EN SC :</p> <p>Insuline :</p> <p>1 unité de couvre grs de glucides</p> <p>Dosage :</p> <p>Correction : si glyc > 130 mg/dl ajouter la correction.</p> <p>Si comptage de glucides, la dose d'insuline doit être inscrite sur la boîte de repas ou dans le carnet de communications. Un tableau peut aussi être mis à disposition du professionnel.</p>
<p>RÉGIME ALIMENTAIRE</p>	<p>Une alimentation saine est recommandée sous la responsabilité des parents.</p> <p>.....</p> <p>.....</p>
<p>SIGNES NECESSITANT UNE INTERVENTION SANS RECOURIR A LA PROCEDURE D'URGENCE</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Si présence de signes d'hypoglycémie : <i>Pour chaque enfant, définir les signes d'hypoglycémie caractéristiques sans perte de connaissance.</i> <i>EX. pour Dupond G : pâleur et tremblement.</i> • Si Glycémie < 70 mg/dl • Si alerte capteur glucose bas : <ul style="list-style-type: none"> ▷ Ressucrage 3gr/10 kg de poids (maximum 15 gr de sucre rapide et ou dextros énergy) • Si présence de signes d'hyperglycémie : <i>Pour chaque enfant, définir les signes d'hyperglycémie caractéristiques.</i> <i>EX. pour Dupond G : polyurie/polydipsie, comportement nerveux.</i> • Si Glycémie > à 250 mg/dl • Si alerte capteur glucose haut : <ul style="list-style-type: none"> ▷ Administrer un bolus d'insuline de correction et vérifier la glycémie 1h après ▷ Si la glycémie reste haute > 250 mgr /dl malgré la correction, appel aux parents.
<p>SIGNES NECESSITANT UNE INTERVENTION EN URGENCE</p>	<p>SIGNES :</p> <p>Hypoglycémie sévère avec perte de connaissance, ou impossibilité de déglutir</p> <p>INTERVENTION :</p> <p>Moins de 4 ans : glucagen IM (1/2 dose si moins de 25 kg)</p> <p>A partir de 4 ans : Baqsimi spray nasal une dose</p>

<p>PROCÉDURE EN CAS D'URGENCE</p> <p>Coordonnées des personnes à contacter en urgence (Tél, GSM)</p> <p>1) Premiers secours : 112</p> <p>2) Parents ou responsables parentaux : (coordonnées du lieu de travail)</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>3) Ligne de garde (convention diabétologie) :</p> <p>.....</p> <p>Quand appeler une ambulance ? (n° 112)</p> <p>Que faire en attendant l'ambulance ou autre personne contactée ?</p>	<p>Cfr signes nécessitant une prise en charge en urgence</p> <p>PLS</p> <p>Glucagen IM</p> <p>La récupération se fait normalement en 10 minutes.</p>
<p>QUAND FAUT-IL PRÉVENIR LES PARENTS ?</p>	<p>Les parents doivent être prévenus immédiatement</p> <ul style="list-style-type: none"> - si hypoglycémie sévère ; - si hyperglycémie persistante malgré correction.

En cas de question, les professionnels doivent d'abord téléphoner aux parents, ensuite, si besoin, aux Conventions de diabétologie

<p>Médecin prescripteur</p> <p>Nom :</p> <p>Prénom :</p> <p>Date :/...../.....</p> <p>Signature</p>	<p>Responsable d'établissement</p> <p>Nom :</p> <p>Prénom :</p> <p>Date :/...../.....</p> <p>Signature</p>
<p>Parents ou représentant légal</p> <p>Nom :</p> <p>Prénom :</p> <p>Date :/...../.....</p> <p>Signature</p>	<p>Médecin scolaire</p> <p>Nom :</p> <p>Prénom :</p> <p>Date :/...../.....</p> <p>Signature</p>

L'école respecte la vie privée. Les données à caractère personnel recueillies dans le présent document sont indispensables à la bonne gestion de l'accueil de votre enfant et sont traitées conformément aux dispositions de la loi du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel du Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (RGPD), et de l'article 458 du Code pénal sur le secret professionnel. Concrètement, cela signifie notamment que : les données à caractère personnel ne peuvent être recueillies et traitées que dans le but susmentionné ; les données à caractère personnel ne seront pas communiquées à des tiers ; vous avez le droit de consulter vos données personnelles ainsi que celles de votre enfant et vous pouvez vérifier leur exactitude et faire corriger les éventuelles erreurs les concernant. A cet effet, vous pouvez prendre contact par mail à ou à l'adresse courrier