


مولود جدید . . . قریبا



ONE

مدخل

كراسة موجهة الى

امهات و اباء المستقبل و يتطرق الى مواضيع اساسية مثل الحمل و نمو الجنين او الاستشارات الطبية اثناء فترة الحمل

اثناء القراءة سوف تحصلون على معلومات مهمة و على نصائح و امثلة و اشياء صغيرة تساعدكم على الاعتناء بانفسكم و بطفلكم اثناء هذه الفترة الخاصة

وايضا لكي تكتشفوا تطور الحمل اسبوعا بعد اسبوع و تتعرفوا على هذا المخلوق الصغير الذي يتحرك بداخلكم و لترأقبوا نموه عن طريق الايكوغرافي

له اسم كل هذا يساعد على تطور علاقة متينة بينكم حتى قبل مجبيه الى الدنيا تختاروا و تستمر هذه العلاقة طوال العمر

بين ايديكم الان برنامج غني مليء بالاحاسيس و العواطف

واعلموا انه لمراقبة حملكم يوما بعد يوم ال ONE مفكرة الام) يقترح عليكم ايضا كراسة (و التي تشكل رابطا بينكم وبين المشرفين الصحيين طلبوا هذا الكراسة من المشرف الصحي المسؤول عنكم
ننتمي لكم
قراءة ممتعة

الفهرس

تفكرن بالحمل

من سيقوم بمراقبة حملي

هل انا حاملة

وصلت الى هنا كيف حصل الحمل كيف

كيف ستنموا

لماذا يجب استشارة مختص منذ بداية الحمل

كيف تكون الاستشارة الطيبة قبل الولادة

متى يجب ان تراجعوا المختص المسؤول على مراقبة حملكم

كيف يمكن تقليل المؤثرات الجانبية اثناء الحمل

هل اسلوب حياتي يؤثر على حملي

هل انا المرأة الوحيدة التي لديها قلق و مشاكل اثناء الحمل

كيف ساقوم بارضاع طفلي

احضر قبل الولادة ماذا يجب ان

كيف احضر نفسي للولادة

كيف ستجري الولادة

كيف تكون الاقامة في قسم التوليد

قاموس صغير

تفكرن بالحمل

هل فكرتم باستشارة طبيب نسائي قبل الحمل
هذه الاستشارة تخص امهات و اباء المستقبل

يتاكد الطبيب انكم بصحة جيدة و ذلك بعد تحضير ملفكم الصحي
سيطرح اسئلة حول وضعكم الصحي السابق و حول اسلوب حياتكم و ذلك للكشف عن العناصر التي قد تشكل خطرا على حملكم
عن طريق اجراء تحليل للدم سيتم التاكد من انكم محميين ضد العديد من الامراض المعدية (الحصبة الالمانية داء المقوسات) و اذا كنتم
انتم او شريككم حاملين لبعض الفيروسات مثل (الايدز او التشمغ بالكبد) او بعض الامراض الوراثية
احتياطات مختلفة او تنظيم اسلوب في الكثير من الحالات يقوم الطبيب بالمبادرة لايجاد حل مناسب قبل او اثناء الحمل (اللقالات او
الحياة) الى الخ

هل تعلمون ان

تستطيعون التقليل من مخاطر تشوّهات الجهاز العصبي و ذلك منذ ان تبدأ رغبة الامومة لديكم و اثناء الشهرين الاوليين من الحمل
بتناول كمية زائدة من حمض الفوليك حبة كل يوم و تستطيعون الحصول عليه بسهولة في الصيدليات

لا تترددوا عن طرح جميع اسئلتكم للطبيب
 مهمته ان يجاوب على اسئلتكم و يطمئنكم و يساعدكم

من سيقوم بمراقبة حمل

العديد من الاختصاصيين باستطاعتهم مراقبة حملكم
الطبيب النسائي طبيب التوليد الدایة المولدة الطبيب العام
العاملين في القسم الصحي الاجتماعي المرتبط بـ

ONE

نطلق عليهم تسمية اختصاصي الحمل
دورهم مهم جداً في جميع الامكنة

اختصاصي الحمل سيقومون بالاشراف عليكم بشكل دوري اثناء مراجعات ما قبل الولادة وسوف ينظمون اوقاتهم لـ

اعطاء المساعدة الصحية و النصائح الضرورية اثناء فترة الحمل
تنظيم جلسات الايكوغرافي -
تحضير الاهل للولادة
متابعةم و مراقبتهم اثناء فترة الحمل و الولادة بحسب كل اختصاصي

كل اختصاصي مختص في مجال عمله
طبيب نسائية و توليد

طبيب النسائية و التوليد طبيب مختص يراقب الحمل الطبيعي او المخطر و يقوم بالتوليد بشكل دوري

الطبيب العام
الطبيب العام يستطيع ان يؤكّد الحمل عن طريق تحليل الدم و يقوم بمتابعة حالتكم في حال الحمل المخطر يوجهكم في اغلب الاحيان
إلى الطبيب النسائي يستطيع مساعدكم اثناء الولادة و لكن قليلاً من الاطباء العاملين يقومون بالتوليد

الدایة المؤلدة

الدایة القابلة مخیصة في الصحة و تقوم بمراقبة الحمل و الولادة في الحالة الطبيعية

الاستشارات الطبية اثناء الحمل

بالقرب منكم او بمكان الاستشارات الطبية اثناء الحمل المنظمة من قبل مكتب الولادة و الطفولة مفتوحة لكل الاهالي و هي موجودة سيتم استقبال اهالي المستقبل من قبل مختصين في الحمل (الدایة الطبيب العام او الموظف الصحي المشفى مخصص في الاجتماعي

هذه المجموعة ترافق الاهل و ذلك بتحضير مخطط صحي اجتماعي اثناء فترة الحمل اذا طلب الاهل ذلك
الموظف الصحي الاجتماعي يستطيع زيارتكم في بيتكم

الاستشارات الطبيعية اثناء الحمل
تلعب دورا اساسيا في متابعة صحة الام
و المولود الذي سيأتي

هل انا حامل؟⁷

ما هي الاعراض التي تظهر على

تتأخر الدورة الشهرية
مشودا صدرني يصبح متصلبا و
أشعر بالغثيان أحيانا
أنا محتاجة لأنام أكثر من المعتاد
شهيتي تتغير لدى رغبات متعددة في الطعام
لدى الرغبة في التبول

كيف اتأكد من ذلك؟

بزيارة الطبيب واجراء فحص وتحليل للدم او اجراء الايكوغرافي
هناك جهاز عمل يباع في الصيدليات و ذلك لاجراء فحص للحمل عن طريق البول ولكن صندوق الخدمة الصحية لا يقوم بتسيير
ثمنه ولكن للتاكد اكثر من النتيجة من الافضل الانتظار اربع او خمسة ايام من تأخر الدورة قبل اجراء هذا الفحص

خذوا موعد من اختصاصي الصحة
و ذلك للتاكد من حدوث الحمل
و بان حملكم يتطور بشكل طبيعي

كم من الوقت يستمر الحمل الطبيعي

يستمر الحمل اربعين يوما و ذلك بدءا من بداية الدورة الشهرية الاخيرة
يكون الحمل بعد اسبوعين من بداية الدورة الشهرية في حالة الدورة الشهرية
التي تستمر 28 يوما

قبل اكمال 3 اشهر جلسة ايكيو سوف تظهر عمر الجنين
و التاريخ المتوقع للولادة
من الممكن ان تتم الولادة بعد 10 ايام من الوقت المحدد

من غير الضروري ان تقلقا
اذا تأخرت الولادة قليلا

من الممكن تجنب اجراء تحريض اصطناعي للولادة اعلموا انه اعتبارا من الاسبوع
الاربعين سيقوم المختص بإجراء فحص عن طريق المونوتور او اليكيو



كيف وصل الى هنا

منذ وقت طويل كل شيء جاهز لاستقبال هذا الطفل



المباضن الانابيب الرحم و المهبلي يشكلون الجهاز التناسلي للمرأة
الفرج هو العضو الخارجي للمزيد من المعلومات قوموا باستشارة القاموس الصغير

10

كل شهر بيضة ناضجة تخرج من المباضن
مرورا بالانابيب هذه البيضة تتمركز داخل الرحم
اثناء الاتصال الجنسي ينتقل السائل المنوي عن طريق المهبلي الى الرحم
فيتقدمون بعد ذلك في الخرطوم، وفي هذا المكان حيوان منوي يخترق البوياضة.
تندمج النوتين لتصبح واحدة فقط. قد يحدث ان البوياضتين يتم اخصابها: يتعلق الامر بالتتوأم.

تبدأ البوياضة المخصبة السفر لعدة ايام نحو الرحم.
والانقسام الخلوي يبدأ.
اذالبوياضة تنقسم لعدة أجزاء مستقلة اذا فهي توأم حقيقة.
في هذه المرحلة كل خصائص الانسان المستقبلية (الجنس، لون الشعر، العيون) تكون محددة.

الجنين (البيضة المخصبة) تتعشش في الرحم.
بعد عدة أسابيع يتشكل غلاف يحتوي على السائل السلوكي لحمايته.
دافئ في فقاعته، الجنين يستطيع التحرك بحرية
يتغذى و يتلاكسجن من خلال التبادلات الموجودة في مستوى المشيمة.
الدم المؤكسجن يصله من خلال أو عية الحبل السري.



كيف تكبر؟

٤ اسابيع او ٩ اشهر لتجهيزك للولادة
من الممكن ان تتواءطوا ولا ينكر تحتاج لها لنموك

طولك الطبيعي

٤ اسابيع •



٥ اسابيع •



١١ اسابيع •



٣ أشهر

من الان فصاعدا يسمى جنين

وزنه ٩ سم

وزنه ٥٠ غ

بنت؟ او ولد

يتحدد جنسه الان

لا نستطيع ان نراه

حتى الشهر الخامس

جيد و دافئ داخل الرحم

يتحرك يدور

بيلع السائل الامينوسي

من الممكن ان يمتص اصبعه

شهرين:

ت تكون كل الاعضاء

اللتي تجعل منه كائنا بشريا

رأسه يكبر

ت تكون ملامح وجهه

تظهر اذنيه فمه عيونه

نستطيع تخمين كفيه يديه ارجله

حتى اصابعه




يتشكل هيكله العظمي

المعدة الكبد الكلى تبدأ بالعمل

طوله ٤،٥ سم

وزنه ١١ غ




يكون الحمل حوالي اسبوعين
بعد بداية اخر دورة شهرية
شهر حمل اسابيع ٦ يعني
من اصحاب الطمث
يكون طول
الجنين ملم ٥ و ٤ بین
وزنه ١٢ غ
يتشكل عقله قلبه يدق



٤ أشهر
طوله ١٥ سم
ينموا بسرعة
جلده ناعم مغطى بالزغب
شعره يطول
في الشهر ٥ تحسون بحركته

الشهر الخامس
طوله ٢٨ سم
وزنه حوالي ٥٠٠ غ
الضجيج والاصوات تصل اليه
يسمع الاصوات الجهيرة اكثر من الحادة
اذا اسمعتموه الموسيقى
او اذا غنیتم له اغنية
من الممكن ان يعرفها بعد الولادة

الشهر السادس
يقوم بالدوران مرات عديدة
تحسون بحركته عدة مرات
في اليوم خصوصا و انتم في
حالة استرخاء
اباه يحس به ايضا باللمس
تستطيعون
ان تتواصلوا مع طفلكم
بنام حوالي ٢٠-١٦ ساعة
وزنه حوالي الكيلوغرام
كل اعضائه متشكّلة
لكنه ليس جاهزا للولادة
الاشهر ٣ الاخيرة مهمة جدا له
لينموا ويكون جاهزا
للعيش في الهواءطلق



الشهر السابع

يشرب السائل الامنوسى
ليس منقطعاً من العالم
يسمع الاصوات
بالرغم من الظلام الذي يتواجد فيه
يتلقى اضواء الاشعة
باصابعكم تحسون بظهوره الاملس
يرد على المداعبات بالحركة او السكون
وزنه حوالي **٣ كيلو و النصف**
طوله حوالي **٤٠ سم**



الشهر الثامن

وزنه حوالي **٥٠٠ غ**
يستغل الوقت الباقي له ليتجمل
الزغب والاحمرار على جده
يتلاشى
محمي بطاء ايض رمادي دهني
الآن يقوم الجنين بالدوران الكامل
يتجه راسه الى الاسفل
احيانا لا يفعل ذلك
يكون الحوض او الارجل للاسف
نقول عن ذلك وقفه المقعد



الشهر الثامن

انه جاهز للولادة
في هذا الشهر يأخذ **٣٠** يوميا
وزنه حوالي **٣ كيلو و ٤٠٠ غ**
طوله حوالي **٥٠ سم**
عظام ججمته ليست ملحومة بالكامل
هذه المرونة تساعده
رأسه بالانزلاق اثناء الولادة



لماذا يجب استشارة اختصاصي الحمل منذ البداية؟

في الشهرين الاولين تتشكل جميع اعضاء الجنين

مراقبة دقيقة و مختصة
منذ لحظاته الاولى
مهمة جدا

خذوا بعض الاحتياطات

-لا تستعملوا اي ادوية دون استشارة الطبيب

-احذروا الراديوغرافي في بداية الحمل

يكون الحمل بأمان أكثر عندما تكون هناك علاقة ثقة بينكم وبين الفريق الطبي

ماذا يحصل اثناء زيات قبل الولادة؟

الحمل تطور فيزيولوجي يتطلب اهتمام خاص

الزيارات تساعد على مراقبة الحمل وتطوره ومراقبة صحتكم وصحة الجنين

المختصين جاهزون لسماعكم و الاجابة على جميع اسئلائكم

الزيارات تكون على عدة انواع



الفحص العام

يقوم بالتركيز حول ٣ عناصر مهمة للتأكد من صحة الحمل
ضغط الدم ، وزنكم ، فحص البول

بقاء ضغط الدم في مستوى الطبيعي يعني ان المشيمة تعمل بشكل جيد
و وضع الجنين على مایرام

في كل زيارة سيتهم وزنكم. زيادة الوزن مرتبطة بوزنكم في البداية
يمكن تقدير ذلك عن طريق جدول يسمى مؤشر كوتيليت هذا يوضح اذا كان هناك عدم توازن غذائي

او مشاكل في الحمل اخذ الكثير الوزن يمكن ان يجعل الولادة اكثر صعوبة

هذا لا يعني ان لا تأكلوا طفلكم يحتاج ان تأكلوا بشكل متوازن

لا تتردوا ان تطلبوا النصائح من المختصين الذين يراقبون الحمل

سيجري تحليل البول بشكل دوري و ذلك للبحث عن وجود الالبومين (خطر التشنج) و العدوى

ستقموون بتحليل الدم لمعرفة زمرة دمكم و التأكد من انه لا يوجد لديكم فقر دم

(نقص بالحديد يؤدي الى الارهاق و عدم مقاومة العدوى)

سيتأكد الطبيب بانكم محميين ضد الكثير من الامراض الخطيرة للطفل (الحصبة الالمانية و داء المقوسات)

كما ينبغي القيام بفحص للتأكد عدم وجود مرض الزهري مرض نقص المناعة التهاب الكبد

يعطى لكم نظام للحماية حسب نتائج تحليل الدم

اذ لم تكونوا محميين من الحصبة الالمانية اخذروا التقرب من الاطفال المريضين به و الاشخاص المقربين منهم

خذوا اللقاح بعد الولادة

اذ لم تكونوا محميين من داء المقوسات

يمكن ان يتواجد في

اللحم الغير مطبوخ جيدا و البيض الذي

فرو و براز الكلاب

الأتربة و الفاكهة النية الملوثة ببراز الكلاب

لماذا هو مفيد

ان تغسلوا ايديكم تكرارا و بشكل خاص
قبل تحضير الطعام و قبل كل وجبة
بعد لمس اللحم والاترية والخضروات النية

تجنبوا فرك العينين بايديكم
عند لمسك اللحم الذي او اذا كانت ايديكم ملوثة

لا تأكلوا الا اللحم المطبوخ جيدا و
لا تأكلوا البيض الذي

لا تأكلوا الا الفواكه و الخضار المغسولة جيدا
و المقشرة في حال استحالة التقشير قوموا بطبعتها

تجنبوا او استعملوا القفازات في حال لمس
المواد التي من الممكن ان تكون ملوثة بغضلات الكلاب
(تراب الحديقة ، صحن الكلب)

تجنبوا اللعب مع القطط
بامكان الادوية ان تقلص
خطر عدوى الجنين من التوكسوبلازما
لهذا تحليل الدم
المنتظم مهم جدا لمعرفة تواجد المرض
اذا كنتم غير محميين من مرض
تضخم الخلايا
هذا الفيروس ينتقل من خلال البول
اللعاب الدموي جميع افرازات الاطفال

اذا كان عملكم يجركم التماس بهم
من حقكم طلب الابتعاد عنهم اطلبوا

المعلومات من مسؤولكم او طبيب العمل



امهات الاطفال الصغار عليهن اخذ احتياطات اكثرا
اغسلوا ايديكم في كل مرة تلمسون فيها افرازات الاطفال
اغسلوا ايديكم في كل مرة تغيرون حفاضات طفلكم
اذا كان لديكم جرح في اليدين ضعوا القفازات او الضمادات عند تغيير الطفل
بعد تنظيف انف الطفل او تنشيف لعابه
لا تتنوقووا ابدا رضاعة الطفل او تمصوا مصاصته
لا تستعملوا ابدا ادوات مائدة الطفل
لا تشربوا في نفس الكاس
لا تقاسموا نفس الایس كريم

مراجعة لمراكز الايدز

Hôpital Saint-Pierre

Tél. : 02/535 31 77 - 02/535 41 72

C.H.U. Liège – Département médecine

Tél. : 04/343 41 75

U.C.L. – Clinique Saint-Luc

Tél. : 02/764 21 57 (de 8 à 12h)

Hôpital Erasme

Tél. : 02 :555 45 36

C.H.U. Charleroi

Tél. : 071/ 92 23 05

المزيد من المعلومات

www.preventionsida.org

الفحص النسائي

لكي يلد في وقته يجب ان يبقى عنق الرحم مغلقا حتى الشهر التاسع
الاختصاصيون يستطيعون التتحقق من وضع عنق الرحم بلمس المهبل
اللمس يوضح ايضا اذا كان الجنين في الاعلى او نزل الى الاسفل ويستطيعون التتأكد من وضعية الجنين

حيوية الجنين

في الاسبوع الثاني عشر من الحمل و بواسطة جهاز دوبلر باستطاعتكم سماع دقات قلب الجنين

الايوكوغرافي

بمساعدة الايكو تستطيعون رؤية طفلكم للمرة الاولى على الشاشة
هذا الفحص لا يشكل اية خطورة لكم و لا لطفلكم
هذا سيكون اللقاء الاول بينكما و يمكن مع ابيه ايضا
ليس من السهولة ان نفهم ما نراه

لا تتردوا ان تطلبوا من الطبيب ان يشرح لكم ماذا يظهر على الشاشة
ثلاثة جلسات ايکوا مقررة اثناء الحمل و هي مسدودة من قبل الاجتماعي التامين

الايکو الاول يكون بين ٣-٢ اشهر و هو يساعد على تحديد تاريخ الحمل و التاريخ المحتمل للولادة و عدد الاطفال المنتظرین
الايکو الثاني يكون حوالي الشهر الخامس من الحمل و ذلك لمراقبة نمو الجنين و التاكد اذا كانت هناك تشوہات و تحديد جنس الطفل
الايکو الثالث يكون حوالي الشهر السابع من الحمل و يساعد لمراقبة نمو الجنين و تحديد جلسته

المونيتوريونغ؛ هذا يسجل دقات قلب الجنين و تشنجات الرحم حوالي ٢٠ دقيقة و يكون ذلك عند الحاجة
فحوصات اخرى يمكن ان يطلب منكم القيام بها عند الحاجة
خطورة اصابة الجنين بمرض الثالثي الذهبي (المنغولي) تقييم في الثلاث شهور الاولى
و بداية الثالث الثاني. الفحوصات تكون عن طريق تحليل الدم و الايكو
اذا كانت هناك خطورة فاخذ عينة من السائل الامينوسي يبين عدم وجود الكروموسومات عند الجنين
هذه الفحوصات تكون مصدر قلق للاهل اذا كانت النتيجة فيها خطورة على الاهل ان يقرروا احتمال
انتهاء الحمل لاسباب صحية

اذا واجهتكم مشكلة بهذه لا تكونوا لوحكم اطروا جميع الاسئلة على المختصين الذين يراقبون حملكم

متى يجب ان تقوموا بمراجعة المختصين المشرفين على حملكم بشكل مستعجل ؟

اذا كان هناك

نزيف

نزولسائل الامينوسى

وجع في اسفل البطن او الظهر كما الدورة الشهرية

تناقص حركات الجنين

الم شديد في الراس

الحرارة

تورم في الرقبة

حادث او سقوط

قوموا بمراجعة المختصين في اقرب فرصة اذا كان لديكم

حرق بالبول

نزولسائل بكمية كثيرة او ملون او حارق

من الجهاز التناسلي

تورم الارجل او الفدو

ازدياد الوزن بسرعة



كيف تقومين بانقاص الانزعاجات المرافقة للحمل

تساوة الصدر

استعمال حمالة صدر جيدة نهاراً و ليلاً ستبيح لكم

الغثيان وال الاستقرار

كلوا الفواكه والبسكويت الجاف واللبن
قبل القيام من السرير

زيدوا من عدد الوجبات

إذا طلبتم من المختصين
سيصفون لكم أدوية

الحرقة

كلوا عدة وجبات في اليوم
يمكن استعمال أدوية ضد التحمض

الامساك

وجبات غنية بالالياف
(خبز، رز، خضار، خضراء)
والفواكه ينقص من هذه المشكلة
شرب كمية كافية من الماء تكراراً

الذهاب للمرحاض في ساعات محددة
القيام بالنشاطات الجسمية (مشي، سباحة)
ملاحظة: يجب عدم اخذ مسهل للامعاء
(ادوية) بدون استشارة الطبيب



نزيف اللثة و خطورة التسوس

نزيف اللثة و التسوس بشكل عام مؤقت و لا تحتاج للتدخل
ولكن ينصح بتكثيف غسل الاسنان و اللثة بعد كل وجبة و زيارة طبيب الاسنان في بداية الحمل
لان خطورة التسوس اثناء الحمل اكبر

الارجل والثقلية الدوالي

التمارين الجسدية (خصوصا المشي و السباحة) غسل السيقان بالماء البارد يساعد على حركة الدم
بقدر الامكان لا تبقوا لساعات طويلة واقفين بدون حركة فوموا بتحريك السيقان بالجلوس او الامتداد
احذروا من الحمام الساخن او الشمس الحادة
استعمال جوارب خاصة للدوالي من الممكن ان تكون مفيدة

التشنجات

مرتبط بمشكلة الدورة الدموية. التمارين و الجمناستيك المخصص للحوامل تساعد على انفاس المشكلة
من الممكن استعمال الفيتامينات و الكالسيوم و المغنيزيوم

الرغبة في التبول و التبول اللا ارادي

هذا شئ طبيعي اثناء الحمل
لا تقللوا ابدا من كمية المشروبات
اذا استمر ذلك بعد الولادة
 يجب القيام ببعض التمارين لقوية عضلة العجان
 اذا كانت رغبة التبول يرافقها الالم يجب مراجعة الطبيب

آلام الظهر

هذه احدى اشارات التعب
حاولوا اخذ قسط من الراحة اثناء النهار
العلاج الطبيعي قبل الولادة يمكن ان يساعدكم
اختيار الحذاء المناسب (بدون كعب) يحد من آلام الظهر
حاولوا قدر الامكان امالة الحوض نحو الامام
هذا يريح الجنين و يساعد على اخذ وضعية مناسبة

صعوبة التنفس

تنفسوا بعمق قوموا بالأعمال الجسدية ببطئ
النوم على جنب وضع وسادة بين الارجل يسهل النوم و التنفس
التدخين يزيد صعوبة التنفس و مضر للجنين
انفاس او ايقاف التدخين يحسن بالتأكيد من صحتكم و صحة الجنين

نزول السائل الابيض بشكل اكثـر

هذا شئ طبيعي اثناء الحمل
ولكن قوموا بزيارة الطبيب اذا تغير اللون الى الاصفر و رافقها حرقـة و حـكة

تمدد الجلد (خطوط)

خطوط حمراء او ارجوانية تظهر عادة على الصدر و البطن ثم تصبح بيضاء (بعد الولادة) لا تختفي تماما
انها نتيجة تمدد الجلد (مثلا زيادة الوزن المفاجئ) الكريمات ليست لديها نتائج مؤكدة
ولكن المساج اليومي بزيت اللوز ذو نتيجة جيدة
لا تترددوا بالحديث حول هذه الانزعاجات مع المختصين من الممكن ان يعطونكم بعض النصائح
مختصي التحضير للولادة ايضا باستطاعتهم اعطائكم النصائح (التنفس الم ظهر الارجل الثقيلة)

كيف تنقص من الم ظهر

وضعية الوقف

النساء الحوامل يميلون الى
دفع البطن الى الامام
يجب دفع الحوض الى الامام
اريحوا عضلات البطن
و لا تقوسو الظهر

تجنبوا الوقف لساعات
طويلة بدون حركة



عندما تميلون

قوموا بثني الركبتين لا الجسم


عندما تنامون

وسادة بين الساقين تريحكم كثيرا

عند الجلوس

ميلوا الحوض قليلا الى الامام
ضعوا القدمان على الارض

الارجل فوق بعضها
هذا يعيق دورة الدم
الافضل ان تضعوا القدمين
على مقعد صغير



هل طريقي الحياة تؤثر على الحمل

كل ما اكله الهواء الذي انفسه

كل ما اشربه يصل الى الجنين

اذا ماذَا اكل ماذَا اشرب



لا تأكلوا من اجل اثنين

كثير من هذا قليل من هذا

كل المواد الغذائية مفيدة

كمية من كل شيء ضمن وجباتكم

الافضل ثلاث وجبات يوميا

وجبتين صغيرتين بين الوجبات



الماء عدة مرات في اليوم

كل يوم القليل من المشتقات الدهنية

مرة واحدة في اليوم السمك واللحم

على الاقل
ثلاث او اربع
مرات في اليوم


الحليب او مشتقاته

على الاقل اربع او
خمس مرات
في اليوم الفواكه
و الخضار

في كل وجبة النشويات او الحبوب


النشويات

خبز بسكويت حبوب معجنات حمص بطاطة



الخضار


حسب الرغبة خضار
مطبوخة او نية شوربة



الفواكه

على الاقل فاكهة في اليوم
عصير الفواكه
فواكه مطبوخة

منتجات الالبان



اذا لم يكن لديكم عادة شرب الحليب فلا
تضغطوا على انفسكم
بالشرب اثناء والحمل الرضاعية

استهلكوا منتجات الحليب ٤-٣ مرات في اليوم
(الجبنه و اللبن) احذروا الحليب و الجبن الذي



اللحوم و السمك

مرة واحدة في اليوم
(اللحوم و الأسماك
و البيض)

مرتين في الأسبوع
(السمك)

احذروا من اللحم الذي

المشاريب



الماء ليتر و نصف يوميا
اكثرروا الكمية اذا كنتم تعانون
من الامساك
كمية قليلة من القهوة او الشاي
الخفيف الانثيين من المنبهاتم

المشاريب التي تحوي على السكر لا ينصح بها .
انشاء الحمل و الرضاعة

لان تأثيراتها الجانبية غير معروفة حتى الان

التوابل والأعشاب

كل ما تأكله يصل نكهته الى الجنين
عن طريق السائل الامينوسي
و يتاثر به

الملح

في بلجيكا استهلاك الملح عالي جدا من الافضل الاقلال منه
 تستطعون تبديل الملح العادي بملح اليود
 اليود يوقي الجنين من المشاكل الصحية

السكاكر نالمعجنات
الشوكولاتة الشيس
اليموناد البسكويت
ليست مفيدة للصحة
اذا اردتم التسلية
اختراروا الفوكه اللبن
والمسكرات البندق

الكحول

الكحول الذي تشربه الام يصل مباشرة الى الجنين و يؤثر النمو الطبيعي للعقل
بالاضافة الى ان استهلاك الكحول اثناء الحمل تشكل خطورة على نمو الطفل

حتى كمية قليلة من الكحول تشكل خطرا من الافضل الابعد عنه اثناء الحمل والرضاعة
لذا لانتم شرب كأس من الشرب اثناء الرضاعة لا هاشربوا من قرب وقت رضاعكم لطفلكم

التدخين

التدخين يضر طفلكم لانه تحتوي على مواد خطرة تمنع تغذية الطفل
نحوه يمكن ان يكون الى سرعة و هناك خطورة الولادة المبكرة
لاظهار الممكن ان يعاني من الحساسية او يتعرض الموت المفاجئ
لذا كنتم لا تدخنون ولكنكم تتقدمن هواء فيه دخن هذا خطير ايضا لطفلكم
اخذروا الامثلية عن التدخين
وجود صديق ترك التدخين يمكن ان يساعدكم
لديكم الرغبة في ليقن التدخين اثناء الحمل

المختصين يستطيعون مساعدتكم اثناء الجلسات المجانية لكم لشربكم اثناء الحمل
للزید من المعلومات زوروا موقع

www.grossessesanstabac.be .

جميع انواع المخدرات مؤذية و تشكل خطورة لطفلكم
اذا كنتم تتعاطون تحدثوا مع المختصين الذين يراقبون حملكم
لايجاد افضل الحلول لكم و لطفلكم

حملكم...

هناك العديد من الاعمال الشاقة اكثر من ٦ ساعات باليوم
(الاعمال التي تتطلب حركة كثيرة, استعمال المواد الكيميائية, الرحلات اليومية الطويلة)
تشكل خطورة الولادة المبكرة تحدثوا مع المختصين المرافقين لحملكم
هناك فرصة للابتعد عن الاعمال الخطرة حسب الامكان
حاولوا تنظيم وقتكم ونومكم ٨ ساعات في اليوم

حياتكم الجنسية

اذا لم يكن لديكم اي اشارة للحمل الكاذب او الولادة المبكرة تستطيعون متابعة حياتكم الجنسية بشكل طبيعي
على ان تقوموا بحماية انفسكم من الامراض المعدية (الايدز)
تشعرن بالتغيير في رغباتكم هذا طبيعي
تحدثوا مع شريككم لايجاد التفاهم

التمارين الجسدية

اذا كانت فترة الحمل سيئة لممارسة الرياضة القاسية
فهناك احتمال السقوط الضرب
لكنها فترة جيدة لممارسة التمارين (المشي السباحة)
(الا اذا كان للطبيب رأي اخر)
يؤمن لك كمية جيدة من الاوكسجين
يحافظ على صحتكم ويسهل عملية الولادة
وامكانية عودة الجسم كما كان قبل الولادة



السفر

يجب الابتعاد عن الارهاق القطار الطائرة الباخرة (حتى الشهر السابع) اقل تعبا من السيارة في حال الرحلات الطويلة بالسيارة توقفوا كل ساعتين تحرکوا قليلا او ارتحوا و ذلك لانقصاص الام الظهر بين الثديين و فوق البطن
قدر الامكان خذوا قصطا من الاستراحة والاسترخاء التواصل مع طفلكم

التشمس

التعرض لفترة طويلة لأشعة الشمس دون كريم واقي لا ينصح به لاحتمال ظهور بقع على الوجه
الشمس هي العنصر الاساسي للحصول على فيتامين D الذي يؤمن الكالسيوم للجسم
الذي تحتاجه الحامل لها و لجنينها
قوموا بعرض الذراعين والساقين لأشعة الشمس ٢٠-١٥ دقيقة في اليوم
بدون كريم للحصول على فيتامين D



هل انا المرأة الوحيدة التي تملك المخاوف و الصعوبات اثناء الحمل

لم اكن انتظر كل هذا التغيير
في جسدي مزاجي عواطفني انفعالاتي
الجبن الذي احمله في داخلي
احيانا احسه قريبا جدا مني
انه حقا طفلي
احيانا احسه غريب عنى
اسأل ذاتي
هل ساستطيع العناية به كما يجب
هل من الممكن ان لا احبه
هل سيكون طبيعيا
هل ساجد نفسي وحيدة



الكثير من النساء و من الازواج يعيشون نفس المخاوف اثناء فترة الحمل
انه تغيير كبير للمرأة عندما تصبح اما لرجل عندما يصبح ابا
لزوجين عندما يصبحون اهلا لطفل
تقاسموا هذه المخاوف مع من حولكم و مع المختصين
سوف ينصلتون اليكم

ما هو نوع الرضاعة الذي ساختاره لطفي


هذا السؤال يجب ان تفكروا به قبل الولادة

تحديثا مع المختصين المسؤولين عن حملكم حول الموضوع
الامحليب ممتاز لكل احتياجات الطفل نوعيته و كميتها تتغير حسب متطلباته
يُنصح به على الأقل حتى عمر السنة أشهر

حتى اللبا السائل (الذي يخرج من الثديين بعد الولادة مباشرة) غني جدا
يحتوي على اجسام مضادة و مواد اخرى يحمي الطفل من العدوى
في الاشهر الاولى
و لديه تأثير ملتب حيث يسهل خروج الغفي (البراز الاول)

من ناحية اخرى التشنجات الناتجة عن الرضاعة
تساعد الرحم للرجوع الى حجمه الطبيعي بسرعة

رضاعة الطفل ليس صبعا ولكن يتطلب من الام
في الاسابيع الاولى الكثير من الصبر والاستعداد
معرفة المبادئ الأساسية تسهل البدء و الاستمرار في الرضاعة
جلسات مخصصة لاطعاء المعلومات تنظم في الكثير من اقسام الامومة
تساعدكم على القيام باختيار واضح
مهما حصل ستتفقون المساندة من قبل المختصين



ما هي التحضيرات التي يجب ان اقوم بها قبل الولادة

تحضير غرفة الطفل

لتحضير غرفة الطفل اعلموا ان هناك مواد صحية اكثر من مواد اخرى قوموا باخذ معلومات حول المواد التي تريدون استعمالها (الدهان, المواد الاصقة, الخشب)

اخذروا ارضية يمكن غسلها بالماء
ابتعدوا عن السجاد و الموكب من الممكن ان يسبب الحساسية
لنفس السبب ابتعدوا عن الاقرحة الصناعية
قوموا بتهوية الغرفة عدة اسابيع بعد انتهاء اعمال التجديد و التدفين

معدات لرعاية الطفل

المهد عربة الأطفال طاولة لتنظيف الطفل اخذرواها حسب متطلباتكم و التي توفر الحماية لطفلكم
كتيب (كيف تختار معدات لرعاية الطفل) المنشور من قبل ONE
يعطيكم المعلومات الكافية و الاختيار السليم

حقبيكم و حقيبة طفلكم اثناء الاقامة في قسم الامومة

عموماً قسم الامومة تعطيكم قائمة بالمواد التي يجب تحضيرها لكم لطفلكم

هذا بعض منها

معطف بلوزة صدرية

بودي

جوارب

قبعة

بيجاما

من الافضل اختيار الصوف

القطن للالبسة التي تحك بالجلد

بعض الاطفال يتاثرون سلباً بالحرير



بعد ٩ أشهر داخل الرحم طفلكم بحاجة الان ليكون قريبا جدا منكم
سيبدأ بالبحث عن العلاقة مع امه و ابيه اذا حملته بين ذراعيك او حمالة الطفل سيفرح جدا
ايضا تبادل النظارات راحتمكم حركة تنفسكم هدهدتكم كلماتكم تقرحه
الطفل بحاجة الى الحب والاتصال ليكبر
الاستجابة لمتطلباته التي يعبر عنها في اغلب الاحيان عن طريق البكاء تعطيه الامان الطفل
في هذا العمر لا يعرف الاهاوء

الشؤون الادارية

تستطيعون طلب مبلغ لتحضير الطفل منذ الشهر السادس من الحمل
يجب ان يكون تامينكم الصحي منظم لتسقديوا من امكانية التسديد
لا تنسوا ان تطلبوا كتيب (ان تصبح ابا و اما) فيه جميع المعلومات والميزات
(02/542.12.11).

اختيار روضة لطفلكم

اذا كنتم تعملون يجب تحضير ذلك في بداية الحمل (روضة او بيوت الاستقبال للاطفال)
المكان يجب يحجز قبل ٦ اشهر اي في الشهر الرابع من الحمل
اذا اردتم وضع طفلكم في الروضة قوموا بزيارة المكان اولا و
اطرحوا جميع اسئلتكم الخاصة ستشعرون بالراحة اكثر
و تتعرفون على العاملين هناك طفلكم سيشعر ايضا بالراحة
لا تنسوا اذا اردتم الاهتمام اكثر بطفلكم تستطيعون الاستفادة من عطلة الرضاعة او الاستراحة من العمل

للحصول على معلومات اكثر حول الروضات و اختيار الافضل
اقرؤوا كتيب (اي روضة تختارها لطفلكم)
تستطيعون الحصول عليه في اقسام ONE
au 02/542.15.80.

تجهيز الرجوع الى المنزل

فكروا في فترة الحمل بتنظيم عودتكم الى المنزل بعد الولادة
اطلبوا من افراد العائلة او الاصدقاء مساعدتكم في امور اساسية
خلال الاسابيع الاولى للعودة الى المنزل
ممكن ان تطلبوا منهم تحضير وجبات من الاكل
او المساعدة في اعمال المنزل بضع ساعات
او جلب طفلكم الاكبر من المدرسة
هذه المساعدة ستكون مفيدة اكثرا في حالة التوئم



كيف اقوم بتحضير ذاتي للولادة


تحثوا مع الطبيب القابلة العاملين الاجتماعيين عن كيفية حصول الولادة
استعلموا حول اسلوب المختصين المسؤولون عنكم و قسم الولادة الذي سيستقبلكم
فكروا حول الاسلوب الملائم لكم
انه مهم الجمجم بين ما تنتظروه وبين اسلوب العاملين المختصين و الامكانيات المتواجدة في قسم الولادة
العديد من اقسام الولادة يقتربون على الام اخذ حمام اثناء بدا عملية الولادة
اقسام اخرى تقترح المشي او استعمال الكررة
من الممكن الولادة في وضعية الجلوس او الاستنقاء على طرف
حرية والحركة الاختيار تساعد الام على تحمل آلام الولادة و تسهل عملية التشنجات

هل تفضلون الابرة المسكنة
يعطى في الظهر ولا يشكل اي خطورة
احيانا لا تسمح للام ان تدفع بقوه
يقضي على شعور الالم من العمود الى القدمين و لا تشعرین بالتشنجات
استفسروا حول ذلك من المختصين و اختاروا الافضل لكم

زيارة قسم الامومة
قوموا بزيارة قسم الامومة مسبقا ستشعرون بالراحة اكثر اثناء الولادة
المكان سيكون مأولا لكم من الممكن زيارة غرفة الولادة ايضا
هناك بعض اقسام الامومة ينظمون جلسات لاطياء المعلومات لاهالي المستقبل
استفسروا حولها العاملين الصحيين الاجتماعيين في ONE

تابعوا جلسات التجهيز للولادة
بالاضافة للاساليب التقليدية هناك اساليب متعددة للتجهيز للولادة
(الابتونومي السوافرولوجي تمارين داخل الماء الموسيقى)
باساليب مختلفة و اسعار متباعدة و الهدف هو عزيزه الحمل و الولادة بشكل افضل
هذه التمارين تساعدكم على الحفاظ على الصحة و الاسترخاء و التنفس بشكل جيد
هذه التمارين ستستخدمونها اثناء الحمل و الولادة
بالاضافة الى ذلك فستقضون وقتا خاصا لكم و تقابلون نساء حاملات مثلكم سيكون هذا لطيفا

الكثير من جلسات التحضير للولادة
تستقبل الآباء أيضا
هذا يجعله يعيش الحدث عن قرب
في الكثير من الاحوال الآباء هم اكثر راحة
سيدربون على بعض الحركات
لمساعدة شريكهم
اثناء الولادة و استقبال الطفل



؟ كيف تحصل عملية الولادة

ما هي علامات بدا عملية الولادة؟

سدادة المخاض

نزول المخاض و احيانا معه دم و هذا يدل ان الولادة قريبة من الممكن ان يبدا ٣-٢ ايام قبل الولادة او قبلها ببعض ساعات

النقلصات

تشنجات الرحم تصبح اكثر صلابة و بانتظام تستطعون الاحساس بها عندما تضعون ايديكم على بطんكم اثناء الولادة تساعد هذه النقلصات عنق الرحم على التمدد و دفع الجنين الى الاسفل انه من الطبيعي ان تحس المرأة الحامل بهذه النقلصات قبل الولادة لكنها تكون قصيرة و غير منتظمة و غير متكررة و غير مؤلمة اذا شعرتم بالنقلصات قبل الشهر الثامن يوميا و تكون مؤلمة فوّموا بأخبار المختصين الذين يراقبون حملكم

في يوم الولادة ستشعرون ان النقلصات تكون متباude في البداية ثم تصبح متقاربة و يزداد الالم اذ لم تتوقف خلال ساعة او ساعتين هذا يعني ان الولادة تقترب و جاء الوقت للذهاب الى قسم الولادة النقلصات تكون مختلفة من امراة لاخري و لكن النقطة المشتركة هي انتظامها

نقول ان العمل قد بدا عندما تكرر النقلصات كل ٥ دقائق خلال ساعة و نصف

اتصلوا مع المختصين الذين يراقبونكم و قيموا الوضع

كونوا هادئين و واثقين من انفسكم تنفسوا بهدوء اثناء النقلصات هذا يساعدكم على الاسترخاء اذ لم يكن طفلكم الاول تستطعون ان تحكموا بانفسكم بحسب تجربتكم هل جاء الوقت اعلموا ان الولادة الثانية تكون اسرع على الغلب

نزول الماء

يتمزق كيس الماء الذي يسبح فيه الجنين عادتا قبل الولادة ولكن احيانا يبقى سليما و يتمزق عندما ينزل الجنين
عندما يتمزق قبل الولادة ينزل السائل الامينوسى عن طريق المهبل
يجب ان لا نخلط بين نزول الماء و البول

حتى لو كنتم لا تشعرؤن بالانقباسات
يجب ان تذهبوا الى قسم الولادة حالا او تطلبوا القليلة التي تراقب حملكم
من الممكن ان تكون الولادة مبكرة اذا جاء الطفل قبل ٣٧ اسابيع
يجب ان تكون تحت المراقبة الطبية و العناية الخاصة
يوجد الان اقسام خاصة ترعاى الاطفال المبكرى الولادة
هناك اختصاصيين سيهتمون بالطفل او الاهل



مراحل الولادة

مرحلة العمل .

هي الفترة

التي و بمساعدة التقلصات يفتح عنق الرحم بالنسبة للولادة الاولى يمكن ان يستمر العمل ٩-٦ ساعات ولكن في الولادة الثانية تكون الفترة اقصر في قسم الامومة ستاتي القليلة بشكل متكرر و ترافق افتتاح عنق الرحم و ذلك بلمس المهبل في البداية ينشق كيس الماء لتسريع العمل (التقلصات هنا تكون اكثر قوة) يتم احضار المونيتورينغ هذه الالة سترافق قلب الجنين و تقييم كثافة التقلصات في هذه الفترة تكون التقلصات مؤلمة

لهذا فالتحضير مسبقا هو مهم جدا حضور شريككم او شخص قريب منكم ستربيكم


مرحلة الخروج

عندما يفتح عنق الرحم ١٠ سم هذا يعني ان الانفصال كامل الباب يكون مفتوحا امام الجنين ليجتاز الحوض و ينزل الى المهبل حينها يجب ان تقوموا بالدفع مع وصول التقلصات بعد عدة مرات الدفع نرى راس الجنين في فتحة الفرج حينها كل شيء يكون جيدا تستطيعون رؤية اكتاف ايدي ارجل طفلكم

عنق رحم مفتوح



تمزق كيس الماء



انه هنا يصرخ نقطع حبل الصرة
نضعه على صدركم و تتبادلون النظرات و اللمس
احيانا تستمر الولادة طويلا حينها
تستعمل الطبيبة بعض الادوات الممحجة للتسهيل
احيانا يتم اخراج الجنين من البطن و تسمى قيصرية

الخلاص

تنفصل المشيمة و تخرج من الرحم
من الطبيعي حينها نزول الدم
اذا تم قطع الفرج اثناء مرور الجنين


ستقوم الطبيبة بقطب الجرح
بعد اجراء تخدير موضعي

و اخيرا سترغبون على طفلكم
اذا اردتم خذوه في حضنكم
سيحس بحرارتكم
برائحتكم و دقات قلبكم

التوسيع



الخروج




* voir glossaire (mini-dictionnaire) p.46 à p.50

كيف تكون الاقامة في قسم الولادة

يشكل عام تكون الاقامة في قسم الولادة ٣-٤ ايام للولادة الطبيعية و ٦ ايام في حال القصوية العديد من المشافي تقتصر عليكم العودة الى المنزل مع زيارة منتظمة من قبل القابلة الاقامة في قسم الولادة يؤمن المراقبة الطبية لكم و لطفلكم وسيتم معاينتكم من قبل الطبيب و مراقبة وزنه كل يوم ستاخذون الوقت للتعرف على طفلكم مسبقاً اثناء الحمل انه يعرف رائحتكم رنات صوتكم و صوت ابيه احسستم به يتحرك حلمتم به تخيلتموه و الان هو التعارف الاعمق هذا رائع مثير و صعب لهذا فمن الضروري توجيه المساعدة لكم اذا اردتم فالقابلة و الممرضة سيساعدونكم حول كيفية العناية به و اطعامه حاولوا قدر الامكان الاستراحة اثناء وجودهم عنكم الولادة متعبة و العودة مع الطفل الى المنزل ايضاً صعبة الزيايرات الطبية بعد الولادة ممتعة لكن متعبة ايضاً حاولوا تنظيمها في الكثير من اقسام الولادة العاملين الصحيين الاجتماعيين يقومون بزيارةكم و يعطونكم المعلومات حول الاقسام الغربية منكم و الخدمات الموجهة لكم

سيعطونكم (كتيب الطفل) انه وثيقة رسمية
ستخدم العلاقة بينكم و بين المختصين
الذين سيرافقون نمو طفلكم
منذ الولادة حتى عمر ١٢



قاموس المصطلحات
قاموس صغير

قاموس المصطلحات

الجلب السري

عضو يربط الجنين بالمشيمة

الفيروس المضخم للخلايا

يرتبط الفيروس المسؤول عن العدوى بفيروس الزهري. فهو المسؤول عن العيوب التي يمكن أن تحدث أثناء فترة الولادة الحديثة.

الموجلات الفوق الصوتية

فحص بلا خطورة للطفل والام على اساس تقنية الموجات الصوتية(اصوات حادة يمكن سماعها من قبل الاذن البشرية). عادة ثلاثة موجات فوق صوتية مقدرة اثناء الحمل. الموجات الفرق الصوتية للربع الاول يسمح بالتحقق للتشغيل الصحيح للحمل، سن الطفل، وقياس الشفافية الفقورية والتاريخ المتوقع للولادة. الموجة الصوتية للربع الثاني يراقب نمو الجنين وغياب نمو التشوّهات. الرابع الثالث للموجة الصوتية تسمح لمعرفة وضع الجنين قبل الولادة و التحقق من نموه و صحته.

الاجهاض

الاجهاض النتائج يحدث خلال 6 الاشهر الاولى. يقع الاجهاض في ثلاثة الاشهر الاولى فقدان الدم والالم في اسفل البطن هي العلامات الرئيسية للاجهاض.

انقطاع الحيض

غياب الحيض

خزعة المشيمة

هذا الفحص نمارسه عندما يكون احتمال كبير بان الجنين لديه شذوذ كروموسومي. بعض الشذوذ الوراثية ممكн كشفها بهذا الفحص. الفحص يستلزم استشارة مسقة مع طبيب وراثة. فحص نسيج المشيمة يتم عن طريق المهل تحت التخدير وتحت مراقبة الموجات الفرق الصوتية ما بين 9 و 11 أسبوع من الحمل. لانه يمكن حدوث خطر الاجهاض. هذا الفحص يجب ان يقوم به فرق طبية متخصصة. وليس مؤلم للطفل او امه.

العملية القصوية

يتم هذا الاجراء اذا كان الحوض صغير جداً اذا كانت التقلصات ليست كافية، او اذا كانت الولادة طويلة جداً او اذا الجنين يتحمل و يتوجب لتنقلات الممارسة. طبيب الولادة يمارس اذا فتحة في جدار بطن الام لاستخراج الطفل. تتم العملية القصوية بتخدير علم او تخدير فوق الجافية. تخدير فوق الجافية الام تكون واعية و يمكن ان تشارك في ولادة طفلها.

الشفافية الفقورية

جيب صغير من السائل الموجود تحت جلد عنق الجنين.

السائل السلوبي

السائل الذي يسبح فيه الجنين داخل الرحم.

العقي

هي المادة الخام الاولى المسودة السميكة تفرز من قبل حديثي الولادة في بداية حياته.

الرصد

هذا الجهاز الذي لا يسبب اي الم للطفل او الام يمكن من تسجيل نبضات القلب للطفل في نفس وقت تقلصات الرحم. هي طريقة لمراقبة حيوية الطفل. في العديد من حالات الحمل يستعمل هذا الاسلوب في الولادات. الطبيب يمكن ان يفعل الفحص في وقت متأخر من الحمل للتتأكد من الحالة الصحية للطفل

الملقط

أداة تستخدم في بعض الأحيان أثناء الولادة لمساعدة خروج الطفل عن طريق سحبه من الخارج.

مبحث الملامسة

أو فن اللمس يهدف هذا الاسلوب لانشاء علاقة المودة بين الطفل والوالد ووالدته خلال فترة الحمل.

اللمس هو الذي سوف يعزز هذا الرابط. خلال فترة الولادة الملامسة، مشاركة نشطة تكون محفوظة للأب.

التوائم

هناك نوعين من التوائم. التوائم الغير متماثلة (الأكثر شيوعا) تأتي من بويضتين مخصبة بحيوانين متوفيين.

ستعشان البيضتين المختلفتين جنب الاخر في الرحم.


كل بيضة مستقلة تماما عن الاخر (المشيمة مختلفة)

الاطفال اللذين سوف يولدون سيتشابهون كاخ و اخت لا اكثرا يمكن ان يكونا من جنسين مختلفين.

التوائم الحقيقية ينتجان عن بيضة واحدة مخصبة من حيوان منوي واحد.

ولسبب مجهول هذه البويضة تقسم لقسمين متساوين. الاجنة ستكون مدعاومة بمشيمة واحدة. بعض النساء يشاركن نفسلالكيس الذي يخيط بالجينين، وبعض النساء اثنين.

التوائم الحقيقة تتشابه كثيرا ودائما من نفس الجنس.



المبايض

الغدة الجنسية للمرأة بعد 2 عددهم حجم لوزة كبيرة ينتجون ويفزون هرمونات أنثوية (الاستروجين والبروجسترون).

فوق الجافية

محلي للحوض عن طريق حقن مخدر في فضاء فوق الجافية لازلة او تقليل الالم الذي يصاحب الولادة.

عجان

مجموعة من العضلات تغلق الجزء السفلي من تجويف الحوض. يتضمن الفرج من الامام وفتحة الشرج في الجزء الخلفي. عند الولادة العجان يتمدد لسماح مرور الجنين. انفاس العجان يمكن ان يسبب سلس البول. لهذا السبب فإن التمارين الزياضية هي مفيدة جداً للمحافظة على مرونة العجان.

المشيمة

عضو متصل في جدار الرحم، مرتبط عن طريق الحبل السري. يغذي الجنين عن طريق اخذ من دم الام المواد الازمة لتنميته.

السائل الذي يحيط بالجنين (بزل السلى)

يتم هذا الفحص في حالة خطر تشوهدات جديدة (مثلا المنغولية). انها تتطوي على ازالة السائل الذي يسبح فيه الجنين (السائل السلوبي). ويتحقق ابتداء من الاسبوع 16 من الحمل. و يتم الحصول على النتائج بعد ثلاثة اسابيع.



الحصبة الالمانية

هذا المرض عادة مؤدي في حالة حدوثه اثناء الحمل يمكن ان يسبب تشوهات رئيسية للجذين و خصوصا 4 الاشهر الاولى، اختبار فحص الدم يسمح للتحقق اذا الام محمية من هذا المرض يوجد تلقيح ضد الحصبة الالمانية، لكن لا يمكن القيام به خلال فترة الحمل نظرا لتدابير الوقائية.

انظر الصفحة 18.

تسمم الحمل

مرض مرتبط خاص بالحمل. يتضح بتورم في انتفاخ الكا حلبين، القدميين، الاصابع بواسطة زيادة الوزن المفطر و الزلال في البول. ضغط الم غاليبا ما يكون مرتفعا جدا. من المهم تحديده من اجل تحقيق مراقبة في الوسط الطبي..

توكسيبلازما

هذا المرض عادة دون خطورة الا في الحمل، يمكن ان يكون مسؤولا عن انتهاكات خطيرة في الدماغ او العينين للجنين (خصوصا في المرحلة المبكرة من الحمل). الفحص البكر للحمل يمكن من معرفة الام اذا محمية ضد هذا المرض. وفي حالة ان لم يكن ذلك، فان اختبارات الدم العادمة ستبيّن اذا لم يكن لها اصابة بالمرض اثناء الحمل.

قناة فالوب

يتعلق الامر بمررين 5 و 6 سنتيمتر، يربط المبايض الى الرحم. واحدة في اخر الانبوب يتمثل في اتصال مباشر مع المبيض. هامش المתחمة لهذه الاجنة، انتزاع البويضة عندما تكون ناضجة. والاصاب يجري في فالوب.

العدوى بفيروس نقص المناعة المكتسبة

الامراض المنقلة الجنسية. عادة ما يتم اختبار فيروس نقص المناعة البشرية خلال اختبار فحص الدم خلال فترة الحمل و يكون بمدحقة الابوين.

الام الحامل المصابة بفيروس نقص المناعة البشرية، يمكن ان تنقل العدوى لطفلها بنسبة 20 الى 35 في المائة. هذا الخطير يمكن ان ينخفض كثيرا باذارة علاج مضاد للفيروسات. مازلنا لا نفهم لماذا بعض الاطفال تصاب والاخرى لا.

علاج الراحة

هذه الطريقة تعتمد في المقام الاول على الاسترخاء العميق في الفترة التي توجد بها المرأة، خلال الولادة يجب ان يمكنها من الصمود بشكل افضل للتقلصات و المشاركة في الولادة.

الزهي

هذا المرض المنقول جنسيا. امراة مصابة ببيكروب يمكن ان تنقل المرض لجينتها. اذا هذا هو الحال فان الطفل يكون مصاب على مستوى العظام كعلى مستوى الاعصاب. فلهذا فان فحص المرض يتم بالخذ دم للتمكن من معالجة الام.

مصادمة

أداة تخطى على رأس الجنين عند تطلب شروط الولادة ذلك، حيث يسمح بجذب الجنين إلى الخارج.

الفرج


عضو خارجي للجهاز الأنثوي للمرأة، متكون من شفتين كبيرتين بالخارج، من البذر و شفتين صغيرتين من الداخل.

الرحم

عضلة جوفاء وملساء على شكل احصنة. يسمى الجزء العلوي منه على نطاق أوسع بالجسم. عنق الرحم مصطف باعشرية مخاطية وتدعى بطانة الرحم التي فيها تعشش البويضة المخصبة. خلال الحمل وزن و حجم الرحم يتزايد.

المهبل

قناة بـ 6 إلى 10 سنتيمتر يربط الرحم بالفرج. المهبل يتمدد لحد كبير أثناء الولادة.





المحرر المسؤول

Benoît PARMENTIER
Chaussée de Charleroi, 95
1060 Bruxelles

تصميم

Service Education Santé de l'ONE

التوضيح

Q. Greban

التنسيق

Service Infographie de l'ONE

موقع الانترنت

www.one.be

D/2008/74.80/66

Avec le soutien de
la Communauté française Wallonie-Bruxelles
et de la Loterie nationale



ONE