

# CALENDRIER DE VACCINATION

## 2022-2023

		Nourrissons					Enfants et adolescents				Adultes		
		8 sem. (2 mois)	12 sem. (3 mois)	16 sem. (4 mois)	12 mois	15 mois <sup>①</sup>	5-6 ans	7-8 ans <sup>②</sup>	13-14 ans	15-16 ans	Femmes enceintes	Tous les 10 ans	65 ans
Poliomyélite	Hexavalent	✓	✓	✓		✓	✓			✓	✓	✓	
Diphtérie													
Tétanos													
Coqueluche													
Haemophilus influenza de type b													
Hépatite B													
Rougeole	R R O				✓								
Rubéole							✓						
Oreillons													
Méningocoque(s) <sup>⑦</sup>					✓								
Pneumocoques		✓	✓ <sup>①</sup>	✓	✓							✓	
Rotavirus (vaccin oral)		✓	✓	✓ <sup>③</sup>									
Papillomavirus (HPV)								✓	✓ <sup>④</sup>				
Grippe (Influenza)										✓ <sup>⑥</sup>		✓	



Recommandé à tous et gratuit



Recommandé à tous



Vaccin combiné (une seule injection)



① Pour les bébés nés avant 37 semaines de grossesse, une dose supplémentaire de vaccin contre le pneumocoque est recommandée à 3 mois et les vaccins prévus à 15 mois seront administrés à 13 mois (hexavalent et méningocoque C).

**Hexavalent** : Vaccin qui confère une protection contre 6 maladies

- ② Depuis septembre 2020, la deuxième dose du vaccin RRO est administrée à 7-8 ans. Les enfants plus âgés qui n'ont pas encore reçu la vaccination peuvent être vaccinés à 11-12 ans.
- ③ En 2 ou 3 doses en fonction du vaccin administré.
- ④ Vaccination en 2 doses à 6 mois d'intervalle (minimum 5 mois d'écart).
- ⑤ À partir de 24 semaines et idéalement avant 32 semaines de grossesse.
- ⑥ Pendant la saison grippale, quel que soit le stade de la grossesse.
- ⑦ Un vaccin contre le méningocoque C est disponible gratuitement dans le cadre du Programme.

Ce calendrier est susceptible d'être modifié au fil des ans.

Votre médecin pourra éventuellement l'adapter à votre enfant, n'hésitez pas à discuter vaccination avec lui.

**Pour plus d'infos :**

Consultez votre médecin traitant ou le site

[www.vaccination-info.be](http://www.vaccination-info.be)

