

Были ли вы, либо ваш ребенок в тесном контакте с людьми имеющими подобные симптомы ?

Чувствуете или наблюдаете ли вы у вашего ребенка подобные симптомы ?

Путешествовали ли вы в местах, где наиболее распространен туберкулез ?

Не откладывая, поговорите об этом со своим врачом.



**Больного туберкулезом можно вылечить, если своевременно выявить заболевание и лечить его.**

Выявление (обследования, анализы и проч.) и лечение туберкулеза могут быть либо бесплатными, либо на это может выделяться финансовая помощь.

## ТУБЕРКУЛЕЗ МОЖЕТ КОСНУТЬСЯ И МЕНЯ

ОТВЕТСТВЕННЫЙ ЗА ВЫПУСК  
Benoît PARMENTIER

ПОДГОТОВЛЕНО  
ONE

EDSDE0000  
D/2016/74.80/26



За дополнительной информацией о туберкулезе обращайтесь в ФАРЕС (Фонд респираторных заболеваний)

Вебсайт : [www.fares.be](http://www.fares.be)  
Тел : 02 512 29 36  
Электронная почта : [info@fares.be](mailto:info@fares.be)




Chaussée de Charleroi 95 - 1060 Bruxelles  
Tél. : +32 (0)2 542 12 11 / Fax : +32 (0)2 542 12 51  
[info@one.be](mailto:info@one.be) - ONE.be



переведено



## ТУБЕРКУЛЕЗ МОЖЕТ КОСНУТЬСЯ И МЕНЯ



## ТУБЕРКУЛЕЗ - ЭТО

**ЗАБОЛЕВАНИЕ**, вызванное микробом (палочкой Коха - ВК). Заболевание обычно поражает легкие, реже - кости, кишечник, почки и проч.

Эта болезнь является заразной. Когда больной кашляет, говорит или чихает, он распространяет в воздухе микробы, присутствующие в его легких.




При регулярном и тесном контакте с больным, вы вдыхаете эти микробы.

**ЛЮБОЙ ЧЕЛОВЕК МОЖЕТ ЗАРАЗИТЬСЯ, В ОСОБЕННОСТИ МАЛОЛЕТНИЕ ДЕТИ.**



## РЕГИОНЫ, В КОТОРЫХ НАИБОЛЕЕ РАСПРОСТРАНЕН ТУБЕРКУЛЕЗ



□ Регионы с высоким уровнем опасности

• Центральная и восточная Европа (Болгария, Польша, Румыния и страны бывшего СССР)

• Африка

• Азия и Ближний Восток

• Америка, кроме Канады и США

■ Регионы с низким уровнем опасности

СИМПТОМЫ БОЛЕЗНИ НЕ ВСЕГДА ПРИСУТСТВУЮТ В ОДНО И ТО ЖЕ ВРЕМЯ.



Непрекращающийся кашель



Усталость



Повышенная температура тела (38°)



Повышенное потоотделение ночью



Мокрота (отхаркивание), иногда с кровью



Потеря веса или приостановление набора веса у детей

У МАЛОЛЕТНИХ ДЕТЕЙ ЗАБОЛЕВАНИЕ МОЖЕТ РАЗВИВАТЬСЯ БЫСТРО С МАЛЫМ ПРИСУТСТВИЕМ ИЛИ ПОЛНЫМ ОТСУТСТВИЕМ СИМПТОМОВ