

# LA CONTRACEPTION APRÈS LA NAISSANCE D'UN BÉBÉ



Vous venez d'accoucher, votre corps a besoin de temps pour récupérer.

Une contraception est indiquée pour éviter une nouvelle grossesse trop rapprochée.

#### **QUELLE CONTRACEPTION CHOISIR ET QUAND LA COMMENCER?**

Pour vous aider à choisir une contraception adaptée à votre situation, parlez-en à un professionnel de la santé déjà pendant votre grossesse et/ou à la maternité.

Les rapports sexuels sont déconseillés pendant au moins les 4 semaines qui suivent l'accouchement.



L'allaitement maternel ne protège pas efficacement d'une grossesse.

ONE.be



# LA MINI-PILULE



# **POUR QUI?**







Toutes les femmes, allaitantes ou non



#### **QUAND COMMENCER?**

Dès l'accouchement

# **CA S'UTILISE COMMENT?**



1 comprimé/jour

#### Juin

D L M M J V S  $1\sqrt{2}\sqrt{3}\sqrt{4}\sqrt{5}\sqrt{6}\sqrt{7}\sqrt{2}$ 8 \( 9 \sqrt{10} \sqrt{11} \sqrt{12} \sqrt{13} \sqrt{14} \\ 15 16 17 18 19 20 21 22 /23 /24 /25 /26 /27 /28 / 29\_/30



Même heure

Tous les jours sans interruption

#### **AVANTAGES/ INCONVENIENTS**



Seule pilule conseillée en cas d'allaitement



Autorisée juste après l'accouchement



Pas de règles



Fiable si les conditions de prise sont bien respectées



Parfois saignements imprévisibles



Y penser tous les jours à la même heure



Perte d'efficacité en cas de diarrhée ou de vomissements

#### LA PILULE CLASSIQUE



#### **POUR QUI?**



Toutes les femmes, non allaitantes



#### **QUAND COMMENCER?**

Dès la 4<sup>ème</sup> semaine après l'accouchement

# **CA S'UTILISE COMMENT?**



1 comprimé/jour

#### Juin

D L M M J V S  $1\sqrt{2}\sqrt{3}\sqrt{4}\sqrt{5}\sqrt{6}\sqrt{7}\sqrt{2}$ 8 \( 9 \sqrt{10} \sqrt{11} \sqrt{12} \sqrt{13} \sqrt{14} \sqrt{ 15 \ 16 \ 17 \ 18 \ 19 \ 20 \ 21 \ **22** 23 24 25 26 27 28 29 /30 /



Même heure


Chaque jour pendant 21 jours puis arrêt pendant 7 jours : les règles apparaissent


#### **AVANTAGES/ INCONVENIENTS**

Règles régulières




Fiable









# **LA PIQÛRE**



Une injection d'hormones

#### **POUR QUI?**







Toutes les femmes. allaitantes ou non



### **QUAND COMMENCER?**

Dès l'accouchement

# **CA S'UTILISE COMMENT?**



Une injection intramusculaire tous les 3 mois réalisée par une infirmière ou un médecin.

## **AVANTAGES/ INCONVENIENTS**



On ne doit pas y penser pendant 3 mois



Fiable



Parfois prise de poids



Parfois saignements imprévisibles



Règles perturbées : absence ou irrégularité

# LE PRESERVATIF MASCULIN



Une gaine en latex ou polyuréthane

#### **POUR QUI?**



#### QUAND COMMENCER?

Dès le premier rapport sexuel après l'accouchement

# **CA S'UTILISE COMMENT?**



On le place sur le pénis avant chaque rapport. Il en existe de plusieurs tailles.

#### **COMMENT L'OBTENIR?**



En vente en pharmacie, en distributeur, dans les grandes surfaces. par Internet.

Gratuit dans un planning familial.

#### **AVANTAGES/ INCONVENIENTS**



Faible coût, facile à se procurer



Protège du SIDA



Protège des MST



Moyennement fiable, à combiner avec une autre méthode



Nécessite une manipulation au moment des rapports sexuels

#### **L'IMPLANT**



Un petit bâtonnet souple de 4 cm de long (longueur d'une allumette)

#### **POUR QUI?**








Toutes les femmes, allaitantes ou non



#### **QUAND COMMENCER?**

Dès l'accouchement

### ÇA S'UTILISE COMMENT?



Ce bâtonnet est introduit (comme une injection) sous la peau du bras par le médecin.

Il doit être retiré et remplacé après 3 ans.

#### **AVANTAGES/ INCONVENIENTS**



On ne doit pas y penser pendant 3 ans



Peut être placé juste après l'accouchement



Très fiable



Pas de règles



Parfois saignements imprévisibles



Parfois prise de poids

# LE DIU (dispositif intra-utérin) ou STÉRILET



Un petit instrument de quelques centimètres. Il peut être en cuivre ou hormonal

#### **POUR QUI?**






Toutes les femmes, allaitantes ou non



#### **QUAND COMMENCER?**

6 semaines après l'accouchement

### ÇA S'UTILISE COMMENT?



Le stérilet est mis en place dans l'utérus par un gynécologue.

Il peut être gardé 3 à 5 ans selon les modèles. Il sera retiré par le gynécologue.

# **AVANTAGES/ INCONVENIENTS**

#### STÉRILET EN CUIVRE



Fiable



On ne doit pas y penser pendant 3 à 5 ans



Règles parfois plus fortes et plus longues

## STÉRILET HORMONAL



Très fiable



Pas ou peu de règles



On ne doit pas y penser pendant 3 à 5 ans



Parfois acné

#### **LE PATCH**



Un patch de 4,5cm x4,5cm que l'on colle soi-même sur la peau

#### **POUR QUI?**



Toutes les femmes, non allaitantes



#### **QUAND COMMENCER?**

Dès la 4<sup>ème</sup> semaine après l'accouchement

#### **CA S'UTILISE COMMENT?**







- Juin
- D L M M J V S
- 8 √ 9 √ 10 √11 √12 √13 √14 ✓ PATCH 2
- 15 \ 16 \ \ 17 \ \ 18 \ \ 19 \ \ 20 \ \ 21 \ \ PATCH 3
- 22 23 24 25 26 27 28 (Pas de patch : les règles apparaissent
- **29√30√**

- Coller le patch sur la peau
- Le laisser en place 1 semaine
- Le renouveler chaque semaine pendant 3 semaines en le collant à un endroit différent
- 4<sup>ème</sup> semaine : pas de patch, les règles apparaissent
- $1\sqrt{2}\sqrt{3}\sqrt{4}\sqrt{5}\sqrt{6}\sqrt{7}\sqrt{\text{PATCH 1}}$

#### **AVANTAGES/ INCONVENIENTS**

- Fiable
- Règles régulières
- Y penser 1 fois par semaine
- Pas compatible avec l'allaitement
- Déconseillé le premier mois après l'accouchement (risque de thrombose)

#### L'ANNEAU VAGINAL



Un anneau souple en plastique de +/- 4cm

#### **POUR QUI?**



Toutes les femmes, non allaitantes



#### **QUAND COMMENCER?**

Dès la 4<sup>ème</sup> semaine après l'accouchement

#### **CA S'UTILISE COMMENT?**



- Placer l'anneau soi-même dans le vagin
- Le garder 3 semaines (21 jours)
- 4<sup>ème</sup> semaine: pas d'anneau, les règles apparaissent

#### Juin

D L M M J V S

 $1\sqrt{2}\sqrt{3}\sqrt{4}\sqrt{5}\sqrt{6}\sqrt{7}\sqrt{2}$ 8 \( 9 \sqrt{10} \sqrt{11} \sqrt{12} \sqrt{13} \sqrt{14} \sqrt{

15 \ 16 \ 17 \ 18 \ 19 \ 20 \ 21 \ **22** 23 24 25 26 27 28

29 /30 /

ANNEAU

Anneau retiré, les règles apparaissent

#### **AVANTAGES/ INCONVENIENTS**

- Fiable
- Règles régulières
- On ne doit pas y penser pendant 3 semaines
- Pas compatible avec l'allaitement
- Déconseillé le premier mois après l'accouchement (risque de thrombose)

# D'autres moyens contraceptifs existent

- le diaphragme,
- la cape cervicale,
- le préservatif féminin,
- les méthodes « naturelles » : indices combinés, méthode MAMA
- la stérilisation de l'homme et/ou de la femme

Si vous désirez utiliser une de ces méthodes, parlez-en à votre médecin ou votre sage-femme.

L'abstinence périodique, la méthode des températures ou le retrait sont des moyens peu fiables : le risque d'une grossesse reste important.

# **COMMENT OBTENIR LA PLUPART DES MOYENS DE CONTRACEPTION?**



- En pharmacie
- Sur ordonnance d'un médecin ou d'une sage-femme

### A QUEL PRIX?



Le coût varie selon :

- Le type de contraception
- Le type d'utilisation (usage unique, journalier, tous les 3 ans...)
- Le conditionnement
- La marque
- L'âge (moins ou plus de 25 ans)

La plupart des mutuelles accorde un remboursement pour tout type de contraceptif sans distinction d'âge.

# **BON À SAVOIR**

Pour toute question sur la contraception, vous pouvez aussi vous renseigner dans un centre de **planning familial**.



SUIVEZ-NOUS SUR NOS RÉSEAUX









